13 Jahre Pilzkartierung im NSG „Brachter Wald“

(ehemaliges Munitionsdepot)

Karl Wehr

Arbeitsgemeinschaft Pilzkunde Niederrhein (APN)

- 215 Exkursionen zwischen April 2000 und Juli 2013
- 1129 nachgewiesene Pilzarten und Varietäten
- 217 Arten auf der Roten Liste NRW
- 100 Arten auf der Roten Liste BRD

Exkursionen im Jahresverlauf

Januar	9
Februar	5
März	13
April	10
Mai	10
Juni	8
Juli	8
August	16
September	20
Oktober	49
November	48
Dezember	18

Neufunde pro Jahr

2000 ab Apr.	207
2001	83
2002	67
2003	22
2004	43
2005	99
2006	146
2007	82
2008	71
2009	27
2010	47
2011	55
2012	149
2013 bis Aug.	30

Leicht erkennbare und weit verbreitete Arten

Wiesenpilze und Arten magerer Standorte

Saftlingswiesen Wasplaatgraslanden

Nährstoffarme, natürliche oder halbnatürliche Graslandbiotope

Gattung	Artenzahl
Hygrocybe, Saftlinge, Wasplaaten	12
Entoloma, Rötlinge, Satijnzwammen (Untergattung Leptonia)	16
Clavaria / Clavulinopsis Wiesenkeulen, Knotszwammen	13
Geoglossum / Trichoglossum Erdzungen, Aardtongen	4
Sonstige	6
	51



Hygrocybe acutoconica Safrangelber Saftling Puntmutswasplant



Hygrocybe helobia Knoblauchsaftling Broze wasplaat



Entoloma chalybaeum Schwarzblauer Rötling Blauplaatstaalsteeltje



Entoloma incanum Braungrüner Rötling Groensteelsatijnswam



Clavaria argillacea Heidekeule Heideknotszwam



Clavulinopsis luteoalba Gelbweiße Wiesenkeule Verblekende knotszwam



Clavaria greletii Blaugraue Keule Donkere knotszwam



Geoglossum cookeianum Trockene Erdzunge Breede aardtong

Neufunde pro Jahr

2000 ab Apr.	207
2001	83
2002	67
2003	22
2004	43
2005	99
2006	146
2007	82
2008	71
2009	27
2010	47
2011	55
2012	149
2013 bis Aug.	30

Leicht erkennbare und weit verbreitete Arten

Wiesenpilze und Arten magerer Standorte

Pilze an (Tot)holz an Pflanzenstängeln und auf Brandstellen



Phlebiella christiansenii Honiggelber Stachelsporrindenpilz Wit schorsnetje



Lachnellula occidentalis Lärchen-Haarbecherchen Larixviltkeltje



Calyptella capula Schalenförmiger Schüsselschwindling Brandnetelklokje



Faerberia carbonaria Kohlen-Leistling Brandplekribbelzwam



Peziza praetervisa Braunvioletter Brandstellen-Becherling

Neufunde pro Jahr

2000 ab Apr.	207
2001	83
2002	67
2003	22
2004	43
2005	99
2006	146
2007	82
2008	71
2009	27
2010	47
2011	55
2012	149
2013 bis Aug.	30

Leicht erkennbare und weit verbreitete Arten

Wiesenpilze und Arten magerer Standorte

Pilze auf Brandstellen an (Tot)holz und an Pflanzenstängeln

Pilze auf Dung



Poronia punctata Punktierte Porenscheibe Grote speldeprikzwam



Coprinopsis pseudoniveus Isabellfarbener Mist-Tintling Valse witte mestinktzwam

Vergleich zwischen den Gebieten

	Brachter Wald	De Meinweg
Zeitraum:	13 Jahre	2 ½ Jahre
Exkursionen:	216	6
Artenzahl:	1129	584

Gesamtartenzahl: 1317

Arten in beiden Gebieten: 394

Arten nur in De Meinweg: 188

Arten nur im Brachter Wald: 735